

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek SALIDERM GEL ostrożnie i zgodnie z informacją na ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.

SALIDERM GEL (*Acidum salicylicum*) 100 mg/g, żel

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancje czynne: kwas salicylowy, 100 mg.
- substancje pomocnicze: etanol 96%, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Opakowanie:

Słoik szklany zawierający 30 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Spis treści ulotki:

- 1. Co to jest lek SALIDERM GEL i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Zanim zastosuje się lek SALIDERM GEL**
- 3. Jak stosować lek SALIDERM GEL**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Przechowywanie leku SALIDERM GEL**
- 6. Inne informacje**

1. Co to jest lek SALIDERM GEL i w jakim celu się go stosuje

SALIDERM GEL ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę, zawiera substancję czynną kwas salicylowy. Lek działa miejscowo złuszcząco, zmiękcząco na zrogowaciały naskórek i wysuszająco.

Wskazania

Lek jest wskazany:

- w miejscowym leczeniu chorób łuszczykowych skóry dłoni, stóp i głowy, w liszaju mieszkowym, w tzw. rybiej łusce.
 - wspomagająco jako czynnik złuszczący i wysuszający w leczeniu trądziku.
 - w usuwaniu nadmiernych zrogowaceń skóry dłoni i stóp.
- Zaleca się stosowanie leku w przypadku, gdy nie jest wskazane natłuszczenie chorej skóry.

2. Zanim zastosuje się lek SALIDERM GEL

Nie należy stosować leku:

- u osób uczulonych na kwas salicylowy lub którykolwiek ze składników leku.
- u dzieci.
- na duże powierzchnie skóry.
- długotrwale.
- na rany i na uszkodzoną skórę.
- na oparzenia.
- na błony śluzowe.
- w ostrych stanach zapalnych skóry.
- wokół oczu.

- w okolicach odbytu i narządów płciowych.
- na znamiona.
- u pacjentów chorych na cukrzycę.
- u pacjentów z zaburzeniami krążenia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek SALIDERM GEL

Z uwagi na to, że kwas salicylowy przenika przez skórę do organizmu, nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry oraz na rany i na uszkodzoną skórę.

Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie przypadkowego kontaktu leku z tymi miejscami, należy lek zmyć ciepłą wodą.

Nie należy stosować jednocześnie na skórę z lekami zawierającymi rezorcynę i rywanol.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.

Stosowanie innych leków:

Brak danych

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

3. Jak stosować lek SALIDERM GEL

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli:

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy wcierać niewielką ilość leku w chorobowo zmienioną skórę raz do dwóch razy na dobę.

Dzieci:

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku nie należy stosować u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku użycia większej dawki leku niż zalecana:

Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Podczas stosowania leku długotrwale, zwłaszcza na dużą powierzchnię skóry lub po przypadkowym spożyciu leku, mogą wystąpić objawy zatrucia kwasem salicylowym.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjent powinien zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, gdyż należy zastosować odpowiednie leczenie.

W przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SALIDERM GEL może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, podrażnienia i stan zapalny skóry. W przypadku wystąpienia tych objawów należy zaprzestać stosowania leku.

Podczas długotrwałego stosowania leku lub stosowania na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego, które mogą się objawiać nudnościami, biegunką, zawrotami głowy, szumem w uszach, zaburzeniami słuchu, nadmiernym stężeniem cukru we krwi, krwawieniami, zmianami na skórze.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku SALIDERM GEL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Data opracowania ulotki:

11.12.2008